

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «МосОМК №1»
Наро-Фоминский филиал**

Специальность: 34.02.01 «Сестринское дело» базовый уровень

Дисциплина: Фармакология

**Самостоятельная работа 1 по теме
«Общая рецептура»**

Выполнил студент

Группы _____, очная (очно-заочная) форма

Преподаватель: Сизова В.В.

Оценка _____

Задание № 1.

Выбрать правильно выписанный рецепт, в остальных - указать ошибки и возможности их исправления.

1. Выписать 20 таблеток, содержащих 0,025капотена. Назначить по 1 таблетке 3 раза в день.

- | | |
|---|---|
| 1. Rp.: Tabulettam Capoteni 0,025
D. S: по 1 таб. 3 раза в день. | 2. Rp.:Capoteni 0,025
D. t. d. N. 20
S: по 1 таб. 3 раза в день |
| 3. Rp.: Tabulettam Capoteni 0,025 N 20
D. S: по 1 таб.3 раза в день. | 4. Rp.:Tabulettam Capoteni 0,025
Da tales doses N 20
S: по 1 таб. 3 раза в день |

2. Выписать 12 порошков, содержащих 0,005 фенобарбитала и 0,15 глюкозы. Назначить внутрь по 1 порошку утром и вечером ребенку 4 месяцев.

- | | |
|--|---|
| 1. Rp.:Phenobarbitali 0,005
Glucosi 0,05
Da tales doses N 12
Signa: по 1 порошку 2 раза в день. | 2. Rp.:Phenobarbitali 0, 005
Glucosi 0, 05
Misce, fiat pulvis
Da tales doses N 12
Signa: по1 порошку 2 раза в день. |
| 3. Rp.:Phenobarbitali 0, 005
Glucosi 0,05
Misce, fiat pulvis
Da. Signa: по одному 2 раза в день | |

3. Выписать 20 порошков арбидола по 0,1 г в желатиновых капсулах. Назначить по 2 капсуле 2 раза в день

- | | |
|---|---|
| 1. Rp.:Capsulis Arbidoli 0,1
Da tales doses N 20
Signa: по 2 капсуле 3 раза в сутки. | 2. Rp.:Arbidoli 0, 1
Da tales doses N 20
Signa: по 2 капсулы 3 раза в день. |
| 3. Rp.: Arbidoli 0, 1
Da tales doses N 20 in capsulis gelatinosis
Signa: по 1 капсуле 3 раза в сутки. | |

4. Выписать 50,0 мази, содержащей 0,5 % преднизолона (Prednisolonum, i, n) . Назначить на пораженные участки кожи.

- | | |
|---|---|
| 1. Rp.: Unguenti Prednisoloni 0,5 % - 50, 0
Da. Signa: на пораженную кожу. | 2. Rp.:Prednisoloni 0, 5 % - 50, 0
Misce, fiat unguentum
Da. Signa: напораженнуюокожу |
| 3. Rp.: Unguenti Prednisoloni 50, 0
Da. Signa: на пораженную кожу. | |

5. 10 суппозиториев, содержащих 0, 005 бисакодила. Назначить по 1 суппозиторию утром и вечером.

- | | |
|--|--|
| 1. Rp.: Bysacodili 0, 005
Da tales doses N 10 in suppositoriis
Signa: 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 20 минут после завтрака. | |
| 2. Rp.:Suppositorium cum Bysacodilo 0, 005 N10
Da. Signa: 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 20 минут после завтрака. | |
| 3. Rp.: Suppositorium cum Bysacodilo 0, 005
Da tales doses N 10
Signa: 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 20 минут после завтрака. | |

6. Выписать 200 мл настоя из 10 г травы зверобоя. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

1. Rp.: Infusi Hyperici 10, 0 – 200 ml
Da. Signa: по 1 столовой ложке 3 раза в день.
2. Rp.: Infusi herbae Hyperici 200 ml
Da. Signa: по 1 столовой ложке 3 раза в день.
3. Rp.: Infusi herbae Hyperici 10, 0 – 200 ml
Misce. Da. Signa: по 1 столовой ложке 3 раза в день.
4. Rp.: Infusi herbae Hyperici 10, 0 – 200 ml
Da. Signa: по 1 столовой ложке 3 раза в день.

7. Выписать 180 мл водного раствора, содержащего 3 % бромид натрия. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

1. Rp.: Solutionis Natrii bromidi 180 ml
Da. Signa: по 1 столовой ложке 3 раза в день.
2. Rp.: Natrii bromidi 3 % - 180 ml
Da. Signa: по 1 столовой ложке 3 раза в день.
3. Rp.: Solutionis Natrii bromidi 3 % - 180 ml
Da. Signa: по 1 столовой ложке 3 раза в день.

8. Выписать 10 мл 2 % спиртового раствора борной кислоты. Назначить по 5 капель в теплом виде в ухо при отите.

1. Rp.: Solutionis Acidi borici 2 % - 10 ml
Da. Signa: по 5 капель в теплом виде в ухо при отите.
2. Rp.: Acidi borici spirituosae 2 % - 10 ml
Da. Signa: по 5 капель в теплом виде в ухо при отите.
3. Rp.: Solutionis Acidi borici spirituosae 10 ml
Da. Signa: по 5 капель в теплом виде в ухо при отите.
4. Rp.: Solutionis Acidi borici spirituosae 2 % - 10 ml
Da. Signa: по 5 капель в теплом виде в ухо при отите.

9. Выписать 6 ампул, содержащих по 1 мл 0,05% раствора прозерина. Назначить под кожу по 1 мл 2 раза в день.

- | | |
|---|---|
| 1. Rp.: Proserini 0,05% - 1 ml
Da tales doses N 6 in ampullis
Signa: под кожу по 1 мл 2 раза в день. | 3. Rp.: Solutionis Proserini 0,05% - 1 ml
Da. Signa: подкожу по 1 мл 2 раза в день. |
| 2. Rp.: Solutionis Proserini 1 ml
Da tales doses N 6 in ampullis
Signa: под кожу по 1 мл 2 раза в день. | 4. Rp.: Solutionis Proserini 0,05% - 1 ml
Da tales doses N 6 in ampullis
Signa: под кожу по 1 мл 2 раза в день. |

10. Выписать 10 флаконов, содержащих по 500 000 ЕД ампиокса натрия. Назначить в мышцу по 500 000 ЕД 4 раза в сутки, предварительно растворив в 5 мл изотонического раствора натрия хлорида.

1. Rp.: Solutionis Ampioxi natrii 500 000 ЕД
Da tales doses N 10
Signa: в мышцу по 500 000 ЕД 4 раза в сутки.
2. Rp.: Ampioxi natrii 500 000 ЕД
Da tales doses N 10 in flaconis
Signa: в мышцу по 500 000 ЕД 4 раза в сутки.
3. Rp.: Ampioxi natrii 500 000 ЕД
Da. Signa: в мышцу по 500 000 ЕД 4 раза в сутки.

4. Rp.: Ampioxi natrii 500 000 ЕД
Da tales doses N 10
Signa: в мышцу по 500 000 ЕД 4 раза в сутки.

11. Выписать 6 ампул, содержащих по 1 мл цититона. Назначить в вену по 1 мл, предварительно растворить в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида.

1. Rp.: Solutionis Cytitoni 1 ml
Da tales doses N 6 in ampullis
Signa: в вену по 1 мл, предварительно растворить в 10 мл 0,9% раствора NaCl.
2. Rp.: Cytitoni 1 ml
Da tales doses N 6 in ampullis
Signa: в вену по 1 мл, предварительно растворить в 10 мл 0,9% раствора NaCl.
3. Rp.: Cytitoni 1 ml
Da tales doses N 6
Signa: в вену по 1 мл, предварительно растворить в 10 мл 0,9% раствора NaCl.

Задание № 2. Выписать в рецептах.

Твердые ЛФ

- 40 таблеток Lisinoprilum по 0.05 По 1 таб. в сутки.
- 10 таблеток Furosemidum по 0.04 По 1 таб. в сутки перед завтраком.
- 30 грамм порошка Magnesii sulfas на 1 прием, развести в ½ стакана теплой воды (слабительное).
- 50 грамм присыпки, содержащей 2% Acidi boricum на пораженные участки кожи.
- 10 порошков Acidi aminосаргонісум по 1 грамму. По 1 порошку 6 раз в сутки, запивая сладкой водой.
- 20 желатиновых капсул, содержащих по 0.5 Laevomycetinum. По 1 капсуле 4 раз в сутки.
- 50 драже "Revitum" По 1 драже 1 раз в сутки.
- 30 таблеток, содержащих по 0.05 Acidi ascorbinicum и 0.002 г Acidi folicum По 1 таблетке 1 раз в сутки после еды.

Жидкие ЛФ

- 100 мл жидкого экстракта Aloes для полоскания рта при стоматите,
- Капли внутрь, состоящие из смеси настоек: 10 мл Convallaria, 10 ml Valeriana, 5 ml Belladonna по 20 капель на ½ стакана воды внутрь 3 раза в сутки за полчаса до еды
- 200 мл настоя из 10 граммов листьев Salvia для полоскания рта при стоматите.
- 25 мл 5% спиртового раствора Iodum для обработки краёв ран.
- 10 ml 5% суспензии Hydrocortisoni acetat по 1 мл в полость сустава 1 раз в неделю.
- 100 ml 0,05% раствора Chlorgexidini bigluconas для обработки ран.

Мягкие ЛФ

- 10 суппозиторий, содержащих по 0,5 индометацина (Indomethacinum, i, n). Назначить в прямую кишку по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
- 12 суппозиторий под названием "Неоанузол" (Suppositoria "Neoanusolum"). Назначить в прямую кишку по 1 суппозиторию 2 раза в день утром и вечером.
- 10,0 мази, содержащей 1% эритромицина (Unguenti Erythromycini). Назначить на пораженные места при пиодермии.

4. 50,0 пасты, содержащей 20 % йодоформа (Pastae Iodoformii). Назначить для смазывания пораженного участка кожи.
5. 50,0 пасты на вазелине, содержащей 2,5 анестезина (Anaesthesinum, i, n), по 12,5 крахмала (Amylum, i, n) и талька (Talcum, i, n). Назначить для смазывания пораженного участка кожи.
6. 26,0 мази на ланолине и вазелине, содержащей 1,0 ксероформа (Xeroformium, i, n) и 5,0 оксида цинка (Zincioхydum, i, n).

ЛФ для инъекций

1. 20 ампул 1% раствора Acidi nicotinicum по 1 мл в ампуле. внутривенно медленно по 1 мл 1 раз в сутки. Предварительно развести в 20 мл изотонического раствора натрия хлорида.
2. 10 флаконов Contrycalum по 10.000 ED во флаконе. Содержимое 1 флакона растворяют в 2 мл изотонического раствора натрия хлорида. Вводить в/в медленно.
3. 40% раствор Glucosum по 20 мл в ампуле, 10 ампул для разведения лекарств.
4. Суспензию Hydrocortisonum 2,5% во флаконе по 5 мл, 10 флаконов по 1 мл в полость сустава 1 раз в неделю.